

Hyperacusis als medische entiteit

Robert Stokroos en Erwin George, Maastricht UMC

[\(robert.stokroos@mumc.nl\)](mailto:robert.stokroos@mumc.nl)

Hyperacusis is gedefinieerd als een versnelde luidheidsopbouw bij patiënten met een normaal gehoor. Het kan worden onderscheiden van recruitment, wat ook duidt op versnelde luidheidsopbouw, maar dan in combinatie met gehoorverlies. De etiologie van hyperacusis vertoont overeenkomsten met de veronderstelde pathofysiologie van tinnitus en van chronische pijnsyndromen. Een aantal KNO-gerelateerde ziektebeelden kunnen met hyperacusis in verband worden gebracht. Deze zijn in het middenoor of in het binnenoor gelokaliseerd. Hyperacusis wordt tevens geassocieerd met bepaalde hersenaandoeningen of –dysregulaties, hetzij verworven, hetzij omgevingsgedieerd. Deze differentiaal diagnose wordt besproken. Er wordt een kort protocol gepresenteerd om bij patiënten met idiopathische hyperacusis een gerelateerde medische conditie aan te tonen dan wel uit te sluiten. Tenslotte wordt ingegaan op de (beperkte) behandelopties van eventueel aan hyperacusis ten grondslag liggende pathologie.