

Aggravatie

Niek Versfeld

Afd. KNO / Audiologie, EMGO+ Instituut, VU medisch centrum, Amsterdam

n.versfeld@vumc.nl

Doel: Bij een klein deel van de patiëntenpopulatie vinden we bij audiometrie resultaten die elkaar lijken tegen te spreken. Eén van de resultaten is dat het spraakaudiogram beter is dan verwacht op basis van het toonaudiogram. In die gevallen is de oorzaak van het gehoorverlies meestal psychogeen en hebben we te maken met aggravatie of simulatie. Het is van belang de aggravant in een vroeg stadium te herkennen, zodat enerzijds behandeling (met bijvoorbeeld steroiden) of revalidatie (met bijvoorbeeld hoortoestellen of CI) voorkómen kan worden, anderzijds het juiste begeleidingstraject opgestart kan worden.

Patiënten en methode: Aan de hand van casus wordt gedemonstreerd op welke manier uit een audiogram aggravatie valt te herkennen. Vervolgens wordt ingegaan welke (objectieve) methoden gebruikt kunnen worden om het daadwerkelijke gehoor vast te stellen.

Resultaten: Op basis van de literatuur zal worden besproken op welke manieren de aggraverende patiënt het best benaderd kan worden en wat mogelijke vervolgtrajecten zijn.

Conclusie: Inzicht in de oorzaken en verschijningsvorm van aggravatie leidt tot eerdere herkenning en daarmee tot een efficiëntere behandelmethode.